

院外処方における疑義照会適正化プロセス

2018 年 11 月 1 日

公立学校共済組合北陸中央病院 薬剤科

以下の①～⑧項目について、原則として疑義照会は事後連絡でも可能とします。ただ、事後に FAX(0766-67-5952)にて連絡いただけますようお願いいたします。

①外用薬の用法変更

用法不備の場合は、資料 1 のコメントを追記してください。

②湿布薬・塗布薬の部位

部位が記載されていない場合は、保険薬局で患者に部位を確認し、用法に追加してください。

③一包化調剤または一包化不可（ヒート投与）の指示

アドヒアランス不良などの理由により調剤方法を変更する場合は、患者さんに服用方法ならびに患者負担について説明後、同意を得てから一包化調剤または一包化不可の指示を追加してください。安定性のデータに留意してください。その際、一包化が必要な理由を教えてください。

④塗布薬の混合指示

同じ Rp 内に 2 剤あれば混合と判断し、混合指示を追加してください。ただし、通常は混合しない薬剤の場合は、至急で疑義照会してください。

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 例：Rp1 リンデロン-V 軟膏 0.12%(5g/本)5 本 | → | Rp1 リンデロン-V 軟膏 0.12%(5g/本)5 本 |
| ヒルドイドソフト軟膏(25g/本)1 本 | | ヒルドイドソフト軟膏(25g/本)1 本 |
| 1 日 1 回 | | 1 日 1 回 |
| 足 | | 足 |
| | | 混合（外用剤のみ） |

⑤先発医薬品の剤型変更

用法・用量が変わらない場合のみ変更してください。安定性、溶解性、体内動態を考慮してください。錠剤、カプセル剤、口腔内崩壊錠は、同剤型とみなしているのが可能とします。その他の剤型間での変更は、至急で疑義照会してください。

例：イクスタンジ 40mg 錠 → イクスタンジカプセル 40mg

⑥成分名が同一の銘柄変更

成分名が同一の銘柄への変更は可能とします。

例：ジャヌビア錠 50mg → グラクティブ錠 50mg

⑦取り決め範囲内での残薬調整

保険薬局で実際に残薬を確認した後、Rp 単位かつ 1 日単位で残薬調整してください。残薬が処方日数以上ある場合は、処方日数を 1 日分残して残薬調整してください。残薬がある場合は、患者さんにきちんと服用するように説明してもらい、服用できない理由等があれば教えてください（疑義照会時に記載してください）。なお、Rp を分割しなければならない場合やその他の残薬調整は、至急で疑義照会してください。

例：残薬がバイアスピリン錠 14 錠、ジャヌビア錠 7 錠ありは、下記のように変更してください。

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|---|----------------|-------|
| Rp1 | バイアスピリン錠 100mg | 1 錠 | | バイアスピリン錠 100mg | 1 錠 |
| | ジャヌビア錠 50mg | 1 錠 | → | ジャヌビア錠 50mg | 1 錠 |
| | 1×朝食後 | 28 日分 | | 1×朝食後 | 21 日分 |

⑧その他の合意事項

- ・ビスホスホネート製剤の週 1 回あるいは月 1 回製剤が、連日投与の他の処方薬と同一日数で処方されている場合は、日数を下記のように変更してください。

(薬歴等で処方間違いが明確な場合)

例：アレト[®]リン酸錠 35mg「日医工」 1 錠 1×起床時 28 日分

→アレト[®]リン酸錠 35mg「日医工」 1 錠 1×起床時 1 週間に 1 回 4 日分

リカルボン錠 50mg 1 錠 1×起床時 28 日分

→リカルボン錠 50mg 1 錠 1×起床時 4 週間に 1 回 1 日分

- ・ミグリトール錠、ボグリボース錠、シュアポスト錠、クラバモックス小児用配合ドライシロップが食直前以外の用法になっている場合は、食直前に用法を変更してください。

- ・漢方薬、ドンペリドン錠、ナウゼリンドライシロップ、プリンペラン錠は、食後の用法でも可能とします。

- ・下記の薬剤に使用滴数の指示がない場合は、添付文書に記載されている通常使用量を追加してください。

| | |
|----------------|---------------|
| タリビッド耳科用液 0.3% | 成人 1 回 6～10 滴 |
| ベストロン耳鼻科用 1% | 1 回 6～10 滴 |
| ホスミン S 耳科用 3% | 1 回 10 滴 |

資料 1

| 薬剤名 | コメント |
|--|-------------|
| MS 温シッフ「タイウ」(5 枚/袋) | 1 日 2 枚 |
| スミルシチック 3% (40g/本) ・セクターローション 3%(50mL/本) | 1 日数回 痛いところ |
| セルタッチパップ 70 (7 枚/袋) | 1 日 2 枚 |
| モーラステープ 20mg (7 枚/袋) ・L40mg (7 枚/袋) | 1 日 1 枚 |
| モーラスパップ 30mg ・60mg (7 枚/袋) | 1 日 2 枚 |
| ロキソニンテープ 100mg (7 枚/袋) | 1 日 1 枚 |
| ロキソニンパップ 100mg (7 枚/袋) | 1 日 1 枚 |
| ロキソフ ロフェン Na テープ 100mg「ユートク」(7 枚/袋) | 1 日 1 枚 |
| ロコアテープ (7 枚/袋) 【院外専用】 | 1 日 1 枚 |